

Ponstin®

pediátrico
IBUPROFENO

4%

Suspensión oral

Analgésico / Antifebril / Antiinflamatorio

Industria Argentina
Venta libre

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE TOMAR **PONSTIN® 4%**, conserve este prospecto, contiene información que puede ser útil volver a leer.

¿Qué contiene **PONSTIN® 4%**?

Cada 100 mL de suspensión oral contiene:

Principios activos: Ibuprofeno 4,0 gramos.

Excipientes: carboximetilcelulosa sódica; avicel RC 591; azúcar; ciclamato de sodio; sacarina sódica; polisorbato 80; col. FD&C rojo 40; sabor tutti frutti; glicirrinato de amonio; metilparabeno sodico; metilpolisiloxano; sorbitol solución al 70%; propilparabeno sódico; lauril sulfato de sodio; ácido clorhídrico; hidróxido de sodio; agua purificada.

Acción:

Analgésico – Antifebril – Antiinflamatorio.

¿Qué es **PONSTIN® 4%**?

PONSTIN® 4% contiene un fármaco denominado Ibuprofeno al 4%. Este medicamento es del grupo de los antiinflamatorios, analgésicos y antifebriles que se utiliza para el alivio sintomático de diversos procesos que cursan con dolor, inflamación y/o fiebre.

¿Para qué se utiliza **PONSTIN® 4%**?

PONSTIN® 4% se utiliza para el alivio temporario de la fiebre, dolores de garganta, boca, dientes y cabeza; para los resfrios y estados pseudo gripales que se acompañan de fiebre y malestar general.

¿Cómo se utiliza **PONSTIN® 4%**?

PONSTIN® 4% es para uso oral. Las dosis en las formulaciones para uso pediátrico se calculan teniendo en cuenta el peso del niño. La dosis recomendada es de 20 a 40 miligramos por kilo de peso corporal por día (20 a 40 mg/kg/día).

Para facilitar la administración se aconseja seguir las indicaciones de la tabla que está abajo.

- Agitar bien antes de usar.
- Es preferible establecer la dosis de acuerdo al peso del niño (ver arriba), de no ser posible tomar como referencia la edad.
- No administrar más cantidad que la indicada.
- En caso necesario repetir la dosis cada 8 horas.
- No administrar más de 3 veces al día.
- En aquellos niños con problemas gástricos se recomienda ingerir el producto con las comidas.

Tabla de dosificación

Peso (kilos)	Edad (años)	Dosis (mL)
11 a 15	2 a 3	2,5 mL
16 a 21	4 a 5	3,75 mL
21 a 27	6 a 8	5 mL
27 a 32	9 a 10	6,25 mL
más de 32	más de 10	7,5 mL

¿Qué personas no pueden tomar **PONSTIN® 4%**?

NO USE este medicamento si usted:

- Es alérgico a alguno de los principios activos o inactivos.
- Si el niño que lo va a consumir es alérgico al Ibuprofeno, a la aspirina o a cualquier antiinflamatorio.

¿Qué cuidados debo tener antes de tomar **PONSTIN® 4%**?

Consulte a su médico ante los siguientes casos:

- El niño se encuentra bajo atención médica por un cuadro clínico severo o está recibiendo cualquier otra medicación, presenta problemas o efectos adversos severos al emplear antiérmicos o antialérgicos.
- Si está deshidratado (pérdida de mucho líquido)

debido a vómitos, diarrea o falta de ingesta de líquidos.

- Si tiene un área del cuerpo donde además de dolor hay enrojecimiento, calor e inflamación.
- Si presenta dolor de garganta severo acompañado de dolor de cabeza, fiebre, erupción, náuseas y/o vómitos.
- Si el dolor de garganta dura más de 2 días con igual intensidad.
- Si tiene problemas o presenta efectos adversos severos por la administración de medicamentos para la fiebre o para el dolor.
- Está tomando cualquier otro medicamento que contiene Ibuprofeno o que sirve para bajar la fiebre o aliviar el dolor.

Aunque el Ibuprofeno posee las mismas indicaciones que la aspirina y el paracetamol, no deben ser administrados juntos.

En el caso de que esté embarazada o amamantando consulte a su médico antes de tomar este medicamento.

No debe usar este medicamento para aliviar el dolor del estómago o abdomen.

Si al tercer día el niño continúa con dolor y/o fiebre, consulte con su médico.

¿Qué cuidados debo tener mientras estoy tomando **PONSTIN® 4%**?

Al igual que todos los medicamentos, **PONSTIN® 4%** puede causar algunos efectos no deseados, aunque no todas las personas lo sufran.

Ocasionalmente, algunas personas, pueden presentar trastornos digestivos como náuseas, vómitos, hinchazón y dolor en la boca del estómago, erupciones en la piel, trastornos respiratorios (sobre todo las personas con alergia a la aspirina), mareos y dolor de cabeza.

Raramente puede disminuir la emisión de pis (oliguria) y aumentar las enzimas del hígado (se ven en el hepatograma).

¿Qué debo hacer ante una sobredosis, o si tomó más cantidad de la necesaria?

Si usted ha tomado más **PONSTIN® 4%** de lo indicado en este prospecto, consulte a su médico.

Ante una sobredosis accidental vaya al lugar más cercano de asistencia médica (concurra al médico) o llame por teléfono a un Centro de Intoxicaciones:

Hospital de "Pediatria R. Gutiérrez"

Tel.: (011) 4962-6666 / 2247.

Hospital "A. Posadas" Tel.: (011) 4654-6648 / 4658-7777.

Centro Nacional de Intoxicaciones: Tel.: 0800-3330-160

¿Dudas? ¿Consultas?

0800-333-3532 (ELEA)

ANMAT responde: 0800-333-1234

Presentaciones:

Envases conteniendo 100 mL de suspensión oral.

¿Cómo guardar este medicamento?

Modo de conservación:

Conservar a temperatura de entre 15 y 30 °C, con el envase perfectamente cerrado. No congelar.

Agitar antes de usar.

Verifique la fecha de vencimiento antes de consumir cualquier medicamento.

MANTENER ÉSTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO.

Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado N° 40.587

Elaborado por Laboratorio ELEA S.A.C.I.F. y A.,

Bajo licencia exclusiva de Warner Lambert Co, U.S.A.,

Sanabria 2353, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Director Técnico: Fernando G. Toneguzzo, Farmacéutico.

Fecha de la última revisión: Octubre / 2016

503746-00 1-cs-69

ELEA