

Ponstinetas[®]

Ibuprofeno 100 mg

Uso pediátrico
Comprimidos masticables

Sabor frutilla

Industria Argentina
Venta Libre

Fórmula:

Cada comprimido masticable contiene: ibuprofeno microencapsulado 70% 142,86 mg (equivalente a 100 mg de ibuprofeno). Excipientes: aspartamo; manitol; esencia de frutilla; hidroxipropilmetilcelulosa; dióxido de silicio coloidal; celuloza microcristalina; ácido fumárico; polivinilpirrolidona; colorante rojo allura laca aluminica; estearato de magnesio; talco.

Acción terapéutica:

Antifebril. Analgésico. Antiinflamatorio no esteroide.

Indicaciones:

Cuadros febriles. Dolores leves a moderados, tales como dolor de cabeza, dolores dentales, musculares. Cuadros inflamatorios postraumáticos. **Ponstinetas[®]** comprimidos masticables está indicado en niños. No está indicado en prevención cardiovascular, no contiene aspirina.

Posología y modo de administración:

A modo de orientación las dosis recomendadas son:

Niños de 4 a 5 años (16 a 21 kg): 2 comprimidos cada 8 horas, (hasta 600 mg/día).

Niños de 6 a 8 años (21 a 27 kg): 2 comprimidos cada 6 a 8 horas, (hasta 800 mg/día).

Niños de 9 a 10 años (27 a 32 kg): 3 comprimidos cada 8 horas (hasta 900 mg/día).

Niños de 11 años en adelante (a partir de 32 kg de peso): 3 comprimidos cada 6 a 8 horas, (hasta 1200 mg/día).

Niños menores de 4 años se sugiere consultar con el médico.

No administrar más de cuatro veces por día.

Se recomienda beber un vaso con agua o alguna bebida sin alcohol después de su administración.

Los comprimidos masticables pueden ser masticados o disueltos lentamente en la boca. También pueden ser administrados disueltos en un poco de agua, leche o bebidas sin alcohol. Los niños mayores y los adultos con buena deglución, pueden ingerirlos enteros.

Contraindicaciones:

No utilizar si es alérgico al ibuprofeno, aspirina u otros analgésicos antiinflamatorios

Precauciones y advertencias:

No usar si el envase está abierto o dañado.

No tomar por más de 10 días para calmar dolores ni por más de 3 días para bajar la fiebre a menos que sea indicado por un médico. Si el dolor o la fiebre persisten o se agravan, si se presentan nuevos síntomas o si el área dolorida está roja o hinchada, consulte al médico.

Si se encuentra bajo tratamiento médico debido a alguna afección grave, consulte al médico antes de ingerir este producto. Al igual que ocurre con la aspirina o el paracetamol, si surge una afección que requiere la administración de medicamentos venta bajo receta, o si ha tenido algún efecto secundario por ingerir cualquier analgésico de venta libre, no tome este producto, sin antes consultar al médico. Si experimenta algún síntoma inusual o que no parece relacionado a la afección por la cual está tomando este producto, consulte al médico antes de continuar su administración. Este producto no contiene aspirina.

Interacciones medicamentosas:

La asociación con otros antiinflamatorios no esteroideos puede potenciar los efectos terapéuticos pero también tóxicos.

Embarazo y lactancia:

Si Ud. está tomando algún medicamento o está embarazada o dando de mamar consulte a su médico antes de ingerir este medicamento.

Uso pediátrico:

Ver posología. No se ha establecido la eficacia y seguridad del Ibuprofeno en niños menores de 6 meses de edad, por lo tanto,

Ponstinetas[®] no está recomendado en ellos.

Atención: pacientes sensibles a la aspirina: no ingiera este producto si ha tenido una reacción alérgica a la aspirina.

Reacciones adversas:

En algunos pacientes pueden ocurrir trastornos gastrointestinales (nausea, vómitos, gastralgias, dispepsia), rash cutáneo, trastornos respiratorios (en los pacientes alérgicos a la aspirina), vértigos y cefalea. Raramente, el tratamiento puede producir aumento de las transaminasas, oliguria y/o agranulocitosis.

Sobredosis:

Ante la eventualidad de una sobredosificación concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología.

- Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: Tel.: (011) 4962-6666/2247.

- Hospital A. Posadas: Tel.: (011) 4654-6648 / 4658-7777.

- Centro Nac. de Intoxicaciones: 0800 333 0160.

Condiciones de conservación y almacenamiento:

Conservar en ambiente seco, entre 15 y 30 °C.

Presentaciones:

Envase conteniendo 24 comprimidos masticables.

Mantener éste y todos los medicamentos en su envase original y fuera del alcance de los niños.

Ante cualquier duda consulte con su médico y/o farmacéutico.

Esp. Med. aut. por el Ministerio de Salud. Certificado N° 40.587.

Elaborado por Laboratorio Elea S.A.C.I.F. y A. bajo licencia exclusiva de Warner Lambert Co, U.S.A. Sanabria 2353, CABA.

Director Técnico: Isaac J. Nisenbaum, Farmacéutico.

Ultima revisión: abril / 2004

501355-00

1-cs-g

Bajo Licencia W.L.



PARKE-DAVIS

ELEA